

BIOGEOGRAFÍA ECOLÓGICA DE LA AVIFAUNA TERRESTRE ESPAÑOLA (PENÍNSULA IBÉRICA)

Documento vinculado a vertebradosibericos.org - AVES y Atlas Virtual de Aves Terrestres de España


Luis M. Carrascal: Diseño y análisis biogeográfico
Stefanie Weykam: Base de datos y desarrollo del Servidor de Mapas
David Palomino, J.M. Lobo, L. Díaz: Preparación y análisis de datos

A la memoria de Francisco Bernis Madrazo.


A los socios de la Sociedad Ornitológica Española, sin cuyo inestimable trabajo este documento no hubiese sido posible.

Seleccionar la especie: por nombre común por nombre científico

- - - (borrar selección actual) - - -
- **Número total de especies en 2500 Km²****
- Accipiter gentilis (Azor Común)
 - Accipiter nisus (Gavilán Común)
 - Acrocephalus arundinaceus (Carricero Tordal)
 - Acrocephalus melanopogon (Carricero Real)
 - Acrocephalus schoenobaenus (Carricero Común)
 - Acrocephalus scirpaceus (Carricero Común)
 - Aegithalos caudatus (Mito)
 - Aegolius funereus (Lechuza de Tengmalm)
 - Aegypius monachus (Buitre Negro)



Variables más asociadas con la frecuencia de aparición de la especie



Factores ambientales - comparación entre las cuadrículas ocupadas y los promedios de la Península Ibérica

Especie de valencia ecológica reducida al distribirse en la Península Ibérica a gran escala.

Tiene marcadas preferencias por lugares con mayor temperatura, mayor insolación, mayor precipitación, reducida extensión de bosques de coníferas y monte bajo, gran cantidad de bosques de hoja ancha y ríos y zonas donde los pastizales y roquedos están bien representados.

menos especialización en gradientes climáticos y de uso de suelo 6.7	más especialización en gradientes climáticos y de uso de suelo
menor temperatura	mayor temperatura
menor insolación	mayor insolación
menor precipitación	mayor precipitación
menos bosque de coníferas y monte bajo	más bosque de coníferas y monte bajo
menos bosques de hoja ancha y ríos	más bosques de hoja ancha y ríos
menos pastizales y roquedos	más pastizales y roquedos

La **marca negra vertical** en los gradientes ambientales representa el promedio de la Península Ibérica.



Proyecto subvencionado por la **Sociedad de Amigos del Museo Nacional de Ciencias Naturales - CSIC** Con la colaboración de la **Sociedad Española de Ornitología**



Online desde: Abr. 2006 Última modificación: 4. 4.2006