Especie	%PRES	IKA10REG	IKA3MAX	D3MAX	urbano	cultivos	campiña	fresneda	dehesa	bosqfrag	encinar	robledal	pinar	sotos	matorrales	pastizales	Altitud media
Corvus corax	37,5	0,45	3,07	0,48	3,7	0,0	0,0	10,0	18,9	1,8	6,1	15,9	23,2	0,4	6,5	13,1	1.244,4
Buteo buteo	58,3	0,39	1,56	0,45	10,0	13,2	8,5	3,8	12,2	2,3	11,8	3,9	11,3	1,8	6,6	14,5	900,7
Gyps fulvus	58,3	0,62	2,64	0,37	6,1	5,6	1,9	5,2	12,2	3,6	8,4	9,0	15,5	1,8	8,3	22,0	1.108,7
Falco tinnunculus	33,3	0,14	0,68	0,11	14,8	25,2	19,7	5,6	7,9	1,1	5,4	0,3	2,0	3,2	4,8	10,0	761,8
Milvus milvus	25,0	0,42	2,30	0,32	5,8	0,1	0,1	10,4	23,6	2,4	7,0	8,5	3,8	0,8	7,0	30,3	1.119,9
Aegypius monachus	20,8	0,11	0,66	0,09	7,1	15,8	0,3	8,8	7,0	1,7	6,0	7,8	14,7	1,0	10,6	17,8	1.014,0
Accipiter nisus	12,5	0,03	0,23	0,06	4,0	13,5	6,0	0,1	17,4	2,9	4,9	14,5	16,5	0,9	8,6	10,7	1.054,0
Aquila chrysaetos	8,3	0,03	0,26	0,04													
Aquila adalberti	8,3	0,02	0,17	0,03													
Circus aeruginosus	4,2	0,01	0,05	0,01													
Circus cyaneus	4,2	0,03	0,20	0,03													
Falco columbarius	4,2	0,01	0,07	0,02													
Falco peregrinus	4,2	0,01	0,12	0,02													
Área muestreada					9,5	10,2	7,1	6,4	7,5	2,2	6,8	5,6	14,7	1,8	10,4	17,2	1.016,4

Tabla 5. Medias de las especies en cada una de las variables descriptoras de los transectos lineales desde vehículo para censar aves con grandes áreas de campeo (rapaces diurnas y Cuervo). Los valores medios se han ponderado por las abundancias medidas (sólo se proporcionan en aquellas especies cuya frecuencia de aparición —%PRES— es mayor del 10%). Como medida de comparación se proporcionan los valores medios de los 24 transectos efectuados (de 25 a 60 km cada uno). %PRES: frecuencia de aparición de la especie en los 24 transectos; IKA10REG: índice kilométrico de abundancia considerando los 929 km recorridos en la región (aves/10 km); IKA3MAX: índice kilométrico de abundancia en los tres recorridos en los que cada especie fue más abundante; D3MAX: media de las tres densidades máximas medidas (aves/km2). Bosqfrag: pequeños bosques aislados y fragmentados en zonas de valle.